ZANONA, Juliane Dias. Má oclusão dentária em porquinho da índia (Cavia porcellus). Bragança Paulista, SP: FESB, 2014. (IMPRESSO)

RESUMO

Os porquinhos da índia São animais que possuem dentes de crescimento contínuo. A oclusão normal é mantida pela ação de atrito que ocorre naturalmente durante a mastigação. A má oclusão ocorre quando não há um correto desgaste dos dentes, levando ao crescimento excessivo principalmente dos dentes molariformes, resultando em dificuldades para se alimentar, podendo até levar a óbito. Os dentes incisivos são simples de serem visualizados, facilitando assim a identificação de qualquer anormalidade, porém na maioria das vezes podem estar aparentemente normais, sendo que isto não garante que não haja alteração dos molariformes. Os dentes molariformes são mais difíceis de serem avaliados devidos á limitada capacidade destes animais em abrir a boca, o que requer o uso de instrumentos especiais e muitas vezes sedação ou anestesia para um melhor diagnóstico. O exame radiográfico do crânio do animal é necessário para avaliar adequadamente essas condições, sendo este o exame complementar de escolha nos casos de suspeita de má oclusão dentária. O tratamento envolve a correção do alinhamento oclusal, através de um procedimento cirúrgico para realização do desgaste dentário, e do manejo alimentar adequado, com introdução de alimentos mais fibrosos e abrasivos, permitindo assim o retorno da função normal da cavidade oral.